


Bioforte® es un nutriente orgánico de rápida absorción, constituido principalmente por aminoácidos libres y péptidos de cadena corta, que la planta utiliza en forma inmediata para hacer frente a sus necesidades proteicas, permitiéndole un ahorro de energía, lo que se traduce en un mejor desarrollo vegetativo y/o reproductivo según sea el estado fenológico al momento de la aplicación. Puede ser aplicado solo o en mezcla con otros productos foliares, tales como abonos minerales y pesticidas, con lo cual se logra adicionalmente una mejora en la absorción de estos últimos.

El producto actúa como regulador del metabolismo nutricional de las plantas. Activador de las funciones enzimáticas y bioquímicas de los vegetales para revitalizar y contrarrestar la detención del crecimiento provocado por diversos tipos de estrés en frutales, hortalizas y cultivos.

Beneficios del Producto

Bioforte® funciona como soporte esencial a los cultivos en procesos tales como:

- Estimula la fotosíntesis
- Favorece la germinación
- Promueve el desarrollo vegetativo
- Promueve la floración y el engorde de frutos



Composición mínima

Aminoácidos libres	6% p/v
Nitrógeno Total (Kjeldahl)	8,7% p/v
Proteína soluble	51,2% p/v

Contiene Fitohormonas naturales

Recomendaciones

Cultivo	Dosis aplicación	Epoca de aplicación
Fruticultura	200 -300 cc/HI 400 -600 cc/HI	Pre floración, caída de pétalos y crecimiento de frutos. Para recuperación de daños causados por heladas, granizo, insectos, viento, etc.
Cítricos	250 -300 cc/HI 400 -600 cc/HI	Aplicar en los periodos de crecimiento vegetativo y post-cuaja. Para recuperación de daños causados por heladas.
Olivos	200 -300 cc/HI	Para recuperación de daños causados por heladas, granizo, insectos, viento, etc.
Hortalizas	200 -300 cc/HI	Aplicar 3 a 5 días después del transplante y repetir cada 15 a 20 días durante el ciclo del cultivo.
Cereales (Trigo, Avena, Cebada, Arroz)	3-5 Lt/ha	Aplicar antes de macolla, inicio de macolla y en post-macolla.
Maiz	3-5 Lt/ha	Aplicar con 2 - 3 hojas. Repetir 15 días después.
Papas	2-3 Lt/ha	Aplicar en prefloración y pos-floración.
Remolacha	2-3 Lt/ha	Aplicar desde 3 a 5 hojas y repetir cada 20-30 días durante el ciclo del cultivo.
Viveros y ornamentales	200 -300 cc/HI	Realizar 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, cada 10-15 días

Compatibilidad: compatible con la mayor parte de los productos de uso común. No se recomienda su utilización conjunta con derivados cúpricos, aceites minerales o azufre. Para mayor seguridad, realizar pruebas de compatibilidad antes de hacer mezclas con otros productos agroquímicos.